庫全書

子部

欽定四庫

全書普濟方卷二百五十八

,子部

詳校官太翳院吏目臣宋 桂

編修臣倉聖脈覆勘 總校官中書臣朱 鈴

校對官中書臣范來宗 騰 録監生臣左熙世

壅而及戻陽氣欲昇陰氣欲降陰陽交錯變成吐利 くこうこ 陰陽不順清濁相干氣射中應名為霍亂也皆為飽 普齊方卷二百五十 膾復啖乳酪海陸百品無所不食多飲寒漿服卧 食治 風冷之氣傷於脾胃中諸食結而不消陰陽二 食治霍亂門論 普濟方 明 周王朱橚 採 氣

之也 己百脈昏亂禁衛俱虚冷搏於筋則今轉筋宜以食治 訶梨勒粥方 高良薑粥方 右以水三大蓋煎訶梨等取汁二蓋去海下米煮粥 不計時候食之 可梨勒皮科生 一两粮米二 方 治霍亂不止心胃煩悶 治霍亂吐利腹痛等疾

蠟粥方 ここうに 服之 右先以水煮粳米作粥臨熟次下蠟更煮臨蠟清温 右以水三大盞煎良薑取二盏半去淖下米煮粥食 黄蠟蜓梗米紅 食治五噎附論 治霍亂後氣脫虛贏或寫不止 判兩 粳米二 書所方

一到 玩四库全書 夫五噎者一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五| 成喧宜食治之也 所至也此皆憂恚嗔恐氣結在於心胷不得通變是以 烏雌鶏切麵美方 口思噎由陰陽不和三膲膈絕津液不利氣不調理之 無力 烏雌鷄甘篗治白麵兩桑根白皮起分赤茯苓 治五噎飲食不下胷中結寒瘦弱 卷二百五十八

KIND WAY / WATER 黄 羊肉索餅方 雌鷄臛索餅方 右以橘皮末及生薑汁和麵作索餅於豉汁中煮熟 右二味末入麵中以水煮桑根白皮湯溶麵切入豉 中煮熟與鷄肉調和一如常法食之 惟食之良 羊肉作雕白麵件生薑合陳橋皮一分湯浸 末桂心末 治五噎胃膈妨寒飲食不下瘦弱無力 治五噎飲食不下胷膈妨寒瘦弱 告所方

全男已居 白電 桂心粥方 治氣噎方 空食亦住 右 無力 右以桂心等麵和末作索餅於豉汁中煮入膽食之 黄雌鷄的隻去毛白麵半桂心末分赤茯苓木 相和以微火煎如稀湯每於酒中調 蜜伴酥西生薑汁 治胃膈疾氣壅結食飲不下如似輕噎 を二百五十八 匙服之或

治噎不下食方 治噎病不下食方 合煮作粥食之 右用崖塞每於粥中化半匙食之 右 右細剉以水三大蓋煎至二大蓋半去滓下粳米二 相和溶作飢鈍於致中煮食之 桂心分赤茯苓和桑根白皮四 春杵頭細糠伴白麵四 善濟方 丙

欽定四庫全書 又方 粳米粥方 噎矣勿令患人知 右用老牛噍沫如枣許大置稀粥中飲之終身不復 梗米川合雄白地好致五粒积殼未一分生薑汁 合大東二枚陳稱皮去白好乾 食治反胃嘔吐 方 治反胃羸瘦四肢娄弱 卷二百五十八

羊肚方 猪肚羹方 欠已日年公告 肚細切任意食之 右 **薤米與煮以熟為度空腹任意食之** 右除薤白米外以水三盞先煎除樂至兩盞去渣下 猪肚净洗去 将四味貯入羊肚內以絕繫頭煮熟去樂拌将羊 羊肚净洗陳橘皮切二两 治反胃食 治嘔吐 脂 参西陳橘出白 普濟方 政并惹白 甘蓝 分細 生薑切一两 Ъ 許少

金罗巴尼 生薑粥方 右以水一斗煮蘆根至七升去滓次用人参等三味 欲盡 右以水二升煎至一升去滓用白粳米一合煮粥更 泽将猪肚細切作奠任意食之餘汁勿棄作三五次 貯在猪肚中以線縫合再用蘆根汁煮令爛熟去藥 蘆根細切 生薑去皮細切扎把紫拭去毛矣 治反胃嘔吐不下食 卷二百五十八

撥粥方 C (1.) (1) 人參粥方 食之 右以水二升煮取一升入栗米一合煮為稀粥覺飢 痢及水痢 鹽醬汁五味等空心温食之 参考本生量取汁 治及胃羸弱身不能動氣泛醋心亦治赤白 取汁白麵四三两班白麵四 治反胃吐酸水

劉舜四府台書 羊肉生湯 薄荷傳飥方 羊肝方 右先将蒜入鹽醋熊羊生空腹任意食之 右以薑汁和麵作撥粥煮食之 右和作傳色煮熟空腹食之 紫薄荷指取汁 麵內 羊肉去脂膜切大蒜去皮細 治反胃食畢即吐出 治反胃朝食夜吐夜食朝吐諸樂不差 治反胃朝食暮吐 卷二百五十八

火之四年全部 一 又方 ス方 續入蝟皮末一錢和服之 右用蒼茸不限多少嫩者端午日取煮熟作菜站食 右用蝟皮一枚炙令焦為末先以水二盡菜豆炭粥 切羊肚五味調 右調和令勺以竹杖穿炙空腹食之一方無硇砂生 羊子肝為條 硇砂瓦館 普濟方

金与せ石 食鶏子法 治反胃 右先将附子為粗末同水二碗煮鷄子水進為度然 令和校吃立止 右用糯米半升裹流水擺取清暴乾烧為末砂糖溶 附子一个处縣鶏子三 1:1-治反胃飲食不進 卷二百五十八

烏鷄法

治結腸織胃飲食入腹經宿則吐食粒不化

後取鷄子温水洗去殼令病者旋食之

夫心煩者由陰陽更虚陰氣偏少陽氣暴勝故也亦有 · / · · · · · · · · · 風熱相搏風毒攻心煩燥昏情狂言失志宜食治之 末半兩調温酒送下次用糯米壓之然後以平胃散 多加薑枣煎神 用紅酒三升煮乾為度去南星不用取鷄食以人參 右以純鳥鷄一隻去腸并毛內南星在內以絕縛定 天南星切作三片 食治煩熱門論 曹秀り

致定匹庫全書 耗實美方 生地黄粥方 右将水煮粥熟下地黄薑汁煮令熟次下蜜并竹瀝 攬轉食後良久或臨卧食 心神娱暢 竊實此者新 生地黄合生薑汁合粳米合淡竹瀝合蜜合 方 治煩熱去渴補中養神益氣除百疾令人 治心膈虛燥煩渴不多飲食小便赤瀝 甜瓜皮切 草菜切两 卷二百五十八

鷄子美方 黑豆美方 CODIA LIKE 熟八五味作类放温食之 右以水二大盞煮二味取一大盞去滓下枸杞葉煮 右以豉汁中相和作奠臨熟破鷄子投入羹中食之 右以或汁相和作奏調和食之 黑豆仁淡竹葉五十 枸杞並葉切雨 鶏子拉尊菜十八淡竹笋皮切 治壅毒攻心煩燥恍惚 治心下煩熱止渇 告诉方

徒神粥方出聖治心胸結氣煩熱或渴狂言驚悸 寒水石粥方 董葉根方出聖治氣壅煩熱或渴 吳四母全書 右以水四大盞煎至二盞半去滓下米煮粥食之 右搖細羅為麵與米同煮為粥食之 霍禁切 寒水石指碎粳米合牛旁根切雨 茯神而羚羊角屑雞粳米合 作总白力 治心下煩熱多渴恍惚 摌 卷二百五十八

滑石粥方出聖治膈上煩熱多渴通利九竅 酸聚仁粥方息方治心臟煩噪不得睡卧 Dalona Liza 右以豉汁中煮調和作类食之 右以水三大蓋煎滑石至二蓋去滓下米煮粥溫食 右灰米作粥臨熟下酸聚仁末半两攪匀食之 酸水仁 滑石平 板米公 為未 粳米二 告再方

松菜羹方忠方通利賜胃除胸中煩熱解酒毒 到 吳四庫全書 葛粉粥方點な治胸中煩熟或渴心燥 玉屑飯方出聖治胸中伏熱心煩燥問口乾氣逆 右用菘菜二斤卖作羹淡食之作虀食亦妙 右将飯散粉內拌今勻入湯內煮令熟用豉汁和 葛粉丽栗米米 梁米飯至菜豆四 ન 表二百五十八

寒熟上氣喘急汗出胸滿喉鳴多痰唾面目浮腫故謂 毛皮皮毛喜受風冷故肺獨易為嗽也寒氣客於肺 夫五臟六腑皆有嗽而肺最多然肺居四臟之上外合 次定四軍全書 人 其状嗽而心痛喉中介介如鯁状甚則咽腫脾嗽者其 肺哦也肝吸者其状左脇下痛甚則不能轉側心敢者 粥食之 右以水浸栗米經宿來日漉出與葛粉同拌令勻煮 食治久新咳嗽附論

者其状腰背相引痛甚則欬述此皆由風寒冷熱所傷 金にプロ 或飲食不節所至宜以食治之也 灌騙方出聖益心潤肺治胸膈煩燥除飲嗽 右肠痛磨磨引於背甚者則不可轉動則嗽劇野嗽 右将百合薯藥天門冬爛研如蜜更取細次入東肉 生藕太椒生百合而生薯藥而白茯苓之雨東 皮核生天門冬三雨坛麵四枚去生天門冬三雨去麵四 方 卷二百五十八 牛乳工家合 4 =

夫血氣者所以榮養身也虛損之人精液萎竭氣血虚 7.17 In 1.11 豆蔻粥方此母府治傷寒後脾胃虚冷嘔逆不下食 服 右先将梗米如常煮作稀粥後下內豆蔻末攬与頓 尋常煮粥令稍稀空心服未差更作黄牛乳亦可 次入茯苓次右先以酥微炒葱入粳米二合用水依 肉豆蔻去般一枚 粳米净洗 食治虚損贏附論 苦海方 キー

到灾匹库全書 灌腸方息な治虚損羸瘦精姜不能飲食冝喫 弱不能充盛肌膚故令人羸瘦宜以飲食補益也 **煮分熟稍冷切作餡子空心食之** 右将肉米并藥末和拌今勻入羊腸內令實繫腸頭 糯米紅鷄子白紅 大羊腸係雀見智前肉細切肉旋蓉切酒浸附子 · 乾量一錢鬼絲子二錢胡椒末鈴漢椒末錢 方

羊腎饆饠方患方治下胨虚损羸瘦腰膝疼腫或多小 C 便 右将樂并棄及腎等拌和為饆饠餡洩麵作饆饠 數重濕紙果於據火中煨令紙焦樂熟空腹食之良 久宜食三兩匙温水飲壓之 肉從塔 研去皮膏核 羊野两對去脂 到去敏皮指末胡椒想末麵两大妻七一两酒浸一有胡椒一錢麵三大妻七 附子麻搖羅為末 書評が 乾量以想 末炮 いく

銀定四庫全書 藥內粥方思方治虚損羸瘦駐顏色或女人產後虚羸 雀児藥粥方出聖治下元虚損陽氣衰弱筋骨不健 等疾 并藥煎取汁三升去滓下米煮粥欲熟入生肉更煮 右以精肉留四兩細切餘一斤十二兩先以水五升 令熟用五味調和空心食之 羊肉斤當歸炒微 生量切分粳米台 表二百五十八 白芍藥錢熟乾地黄錢黃者錢

耆婆湯方忠を主大虚風冷羸弱無顔色 熟空心食之 **教粥欲熟下樂末五錢攪轉入五味調和令勻更煑** 右摄羅為末将雀內先以酒烧入水二大盛次下米 椒 五味子和枸杞子和粳米公酒公 崔児大校到母死然子眼乾别狼末 復盆子 酥斤生薑什一碰白髮切 酒升家开熟油 三合去目 冏 胡麻仁研爛橙葉出致升糖 +

銀定四庫全書 猪肚方忠な補虚贏乏氣力 右先以酒浸一宿紋去滓內酒入銀器中次入酥家! 黄赤色即濾去滓水瓷盒中每日空心焼服一合 油糖薑汁等煎令沸下椒橙葉胡麻慢火煎候薤白 水五升入鐺內微火煮令爛熟空腹食之次緩酒 右搖篩入米合和相得內猪肚中縫合勿今洩氣以 肥大猪肚 者炒去 者妙去汗 葱白七葉粳米白源米雨去日及用葱白七葉粳米三合一作 如食法 人参產頭 乾薑裂到一枚净洗人参二两去乾薑一两炮 卷二百五十八 椒

煎猪 白蜜煎九恵す補虚羸瘦弱乏氣力 しこうえ 右合和以銀器中重湯令可丸下之丸如梧桐子 每服以温酒下三十九日三服稍加以知為度久服 中蓋飲之 令人肥充好顏色 白蜜北臘月猪肪 防忠政治大虚羸因極宜服 升 一方兼下少飯 普濟方 去膜胡麻油微熟熟乾地黄末一开胡麻油米升熟乾地黄末 ቷ

|到 吳四月全書 楚黄色即止候冷煖如人體空腹服頓服之令盡煖 右 榻 右 カロ 1些切以五味調和作羹服空腹飽食之後三日慎 用枸 **卧覆盖至日脯後乃食白粥稀麼過三日後更宜** 用猪肪不中者半斤入葱白一些於銚子內煎令 羊 服羊肝羹方 刌 取以 肝 四升去草 膜細切筋 祀 根汁煎前羊肝等令爛入致 P 升 羊脊寅內細切麵末而枸杞根 起二百五十八 中藏慈白 斤五

骨汁煮索餅方出聖治虚損羸瘦下焦反冷眼昏耳龍 羊脊美方 **てこしし ここ** 粥亦可 熟取去濾過将腎切入葱白五味如常羹食下米作 右用梁米一合水四升煎骨熟入羊腎一對再煎候 食如上法 大羊尾骨煮取汁二選半 葱白漬切 陳稱皮 白羊脊骨者推碎羊髓两具羊野 治下元久冷反骨蒸羸瘦不下食

|動定匹庫全書 羊肉粥方惠方治虚损羸瘦肋陽壮筋骨 却 右 右先将肉去脂皮取精者内留四两細切餘一斤十 米合 都用骨汁煮五七沸去滓用汁少許沒麵作索餅 (两以水五大蓋并黄者等煎取汁三蓋等去滓~ 羊肉二黄者到 人参蘆頭 白茯苓而夷私梗 於汁中與羊肉煮入五味空腹食之 去 白濃焰并芥星麵三羊肉四雨湯浸刊芥一麵三羊肉四 切両

從答粥方出聖治久積虚冷陽氣衰微 黄者粥方患方治虚損瘦弱益氣力除腸風 **たこう ミノニー** 取 右細對和勻每用樂二兩以水三大盞入豪五枚煎 米炭粥臨熟下切了生肉更燙入五味調和空心食 黃耆三兩人參董頭 白茯苓兩生薑錢白深米 合桑根白皮到雨 蓋去海下米煮粥空腹食之 普亦方 ナセ

多定四库全書 羊腎粥方虫な治虚損羸瘦 右 米煮之欲熟次下葱白薤白煮作粥入五味調和空 右先将羊腎及茯蓉入少酒炒後入水二大盞半 雖白景切 慈白姓七鷄子九 羊腎一對去內從蓉刮去敏皮 以五味汁中煮粥臨熟下膠鷄子空腹食之 白羊肉 切四 两肉旋蓉儿雨水 粳米 合 粳米合鹿角膠炒 切一 宿息白景切去

從替羊野粥方無壁漸治野勞風產面色黃黑髮髮焦 羊脊骨粥方患方治虚損羸瘦乏力益精氣 とこつ こん しょ 右剉碎脊骨水九大蓋煎至三大蓋去滓将骨汁入 米轩蓰塔等煮粥熟入葱五味調和候熟即入鬼絲 子末及酒二合攬轉空腹食之 腹食之 羊連尾脊骨握肉從蓉白門去飲皮死絲子酒浸 別搖末 葱白 題切 粳米三三日曝乾葱白三壁去 梗米三 古六方

到安匹庫全書 羊野羹方 乾 煎至二升去滓下磁石薏苡仁各一兩半腎一具凌 右羊腎磁石薏苡仁外剉細為三服每服水二升半 粥空心任意食之 肥健 內從答 洒洗去土 半野 膜細切 石碎热爛薏苡仁丙 惠方治羸瘦虚损陽氣衰弱腰疼無力乃令出聖治羸瘦虚損 東二百五十八 Ξ 羚羊角屑二 磁

黄雌鷄粥方忠す治虚損益氣壮筋骨去膀胱積冷補 11 - 11 JIL - 16 腎氣 右每用鷄汁二大選半和米煮粥欲熟下地黃杏仁 右並於政中養入五味作養空腹食之 黄雌鷄一隻未周年者制之如法杏仁十枚湯浸 仁熟乾地黄月酒三合研絞取汁 粳米合 白羊腎脂膜切肉發蓉刮去毅皮切 葱白去鬚 切羊肺切雨 告所方 え

致定四庫全書 猪肚康方地聖濟治虚損 內從答膽方總録浴臟腑虚損四肢之弱不欲飲食 羹肴鹽醋椒酱五味和空腹食之 右将旋营羊肉細桵和米糁及葱都依尋常煮法作 等更类令熟空心食之 猪肚野去脂膜人参 兩三 肉挺茶 宿司去敏皮葱白景切 糯米糁两羊肉一两酒浸一葱白三些去糯米糁一羊肉 卷二百五十八 麥門冬去心地骨三两

補樂羊肝方忠聖 つこうえ とこう 右以枸杞根汁重煎令沸次入肝肉麵末并葱豉汁 微火養熟隨意飲汁食肉 右除肚腎外細剉用綿裹與肚腎同入水一 棄藥取肚腎肉汁中入葱白一些細切粳米一升用 取九升去海水一丰二升亥 和漸煎如稠分作三分空腹食之 羊肝一具羊脊背肉一條陳麵末 西枸杞根五两 香濟方 Ŧ キ 煮熟

多定匹庫全書 雀兒粥方些聖治臟腑虚損贏陽氣之弱 猪腎羹方 右以五味汁煮作臛空腹食之 **把羹方總録** 右 猪野 以五味汁作羹空腹食之 枸祀斤羊野山 羊肉四 葱白七 雀児 總出 一對 食法細切栗米白葱白三蓝 舉 治諸虚羸益氣 枸杞葉 治羸瘦虚勞 ቲ刀-斤葱白 並切 猪脊育后膜 切去

椒腎羹方忠方治下焦虚損人冷 鶏子索餅方點な治虚損羸瘦令人肥白光澤 大二丁三 ニニー 右以炒肉次入米一合煮用水二大蓋半煮作粥欲 和作羹空腹食之 右取椒麵內拌勻熱水中下並羊腎煮熟入五味 熟下葱白五味等候熟空心食之 漢椒二十粒去目 白麵两鶏子四白羊肉作膽 宿 白麵 两半野 脚切切 曹濟方 主 譋

到灾四库全書 人參煮羊內法此聖濟治勞補益 右以鶏子清沒作索餅於豉汁中煮令熟入五味雅 空腹食之 右細對先以水三升浸藥經兩宿煎之去滓取汁口 升 至飽不盡續食之 汗中和与入羊肚內從五更初煮至平旦細切食之 細切葱白一握鹽少許同羊肉半斤豉一合於樂 人参两枸杞白皮两肉從茶酒洗去

澤渴羹方出聖濟治虚勞補益 食紫菊法思報治虚勞補益 Ja 12 ... J. 1. 補野羹方無雖濟治勞虚損精氣絕竭 月內採花陰乾搖末酒粥養任意食之 右用正月已後五月已前採黃花紫蓝菊葉食之九 右用生澤寫花葉切五兩以水三升煮至一升半去 右細切羊腎入五味葱薑如常法作羹食之 半野品數 葱白切分生薑切分 告かち

金安四库全書 養沒餅方此聖濟治虚勞補益 皆勝粥方忠す治五職虚瘦羸損益氣力堅筋骨填骨 肚乃住 净海下半肚葱豉等於汁中煮香熟任意食之老羊 米粉不得留經宿恐酸壞一方同羊內作奠如常法 相拌和作團如蒸餅大依法蒸熟隨性食之夏月用 用慈豉等熟食之 右用意改仁熟水淘搗羅如作米粉法以來內乳汁 卷二百五十八

枸把煎方患方有人頻運重病虚贏不可平服宜服 粳米煮作粥食之或煎濃飲洗索解食之甚住 髓 右以微火煎取五升去海水瓷盒中每取一合酒 右 三合用湯浸布裹按去皮再研水濾汁煎成飲著好 小蓋合緩每於食前温服 用皆勝子不限多少揀去雜蒸暴各九遍每取二 生枸杞根細 次· 取判 一手五升沉清白羊脊骨細對一年以水五升白羊脊骨一具 告诉方 Ē

|對定匹庫全書 食勞倦則傷脾吐逆食少不成肌膚也久生濕地强 逆也悉怒氣逆上而不下則傷肝目暗筋骨擊痛也飲 夫人有五勞七傷一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰 七傷者是傷五臟六神故也肝藏魂肺藏魄心藏神即 入水則傷腎腰脚重疼行履不任也此則五勞証候也 則傷心髮燥而面無精光也形寒飲冷則傷肺氣促飲 憂勞五日瘦勞盖五勞則傷於五臟也凡人憂愁思愿 食治五勞七傷附論 力

一藏意與智野藏精與志此為七神也且五臟以七神 調適之 之大可知也今言七傷者一日陰衰二日精清裏急三 為主主若無臟如人無室臟若無神如室無人以此比 ULIVIA LILE 裏受敵肌虛筋骨不榮故曰五勞七傷之病也宜以食 日精少四日精消陽事不興五日小 便苦數囊下濕痺 日胸脇苦痛也七日陰寒兩脛厥此皆臟腑虚損表 方 告所方 孟

|到灾四戽全書 樂餅方忠好治五勞七傷下焦虚冷小便遺精宜食啖 腰腎壮陽道 右搖羅為散入麵與酥蜜髓乳相和入來穰熟沒於 盆中盖覆勿冷通氣風半日父即将出更沒令熟擀 附子 兩末 半 刮 口者微炒去半雨去目及 去皮炙乾桂心两五味子兩死絲子漏乾塩酒拌一宿桂心一五味子而死絲子酒浸三 白麵升黃牛乳十十年體再東二十枚煮漢 去皮腳又一兩炮裂 汗酥雨蜜四 神妙三两是 到一两炮 卷二百五十八 肉從答. 為 Ħ

Children Title 酿猪肚方出聖治五勞七傷羸瘦虚弱 右 **燎令熟每日空腹食一野入酵和麵更佳** 搖羅為末每用樂一兩入酥來杏仁米等相和令 有猪肚净去脂人参 董頭 杏仁皮尖研白茯苓 糊大麵以上以筋子碰之即入爐鐵中上下以火 加減大東三十一枚 妙去汗蔣羅分胡椒分黄牛酥雨糯米五合 陳橘皮半兩湯浸乾薑戶分無美分漢椒 告所方 去 胜淘 目分

金岁四月分言 樂髓餅子方出聖治五勞七傷腎氣虚弱腰脚疼痛小 便遺瀝 右 心漸漸食之 与入肚內以麻線縫合即於甑內蒸令熟切作斤空 搖細羅為麵入諸物同和餡分為八分以沒麵包 去皮訶梨勒用皮 縮砂半两去塞一寨一百枚炮裂可梨勒一分根縮砂半两去塞一寨一百枚車量製到 沒我口者做炒去汗水八分門之两 乾薑 限判 漢椒口者微炒去汗 切羊骨髓两白麵二黄牛酥西 卷二百五十 桂心、 分附子

懷香角子方思方治五勞七傷陰菱氣乏 羊野羹方忠聖治五勞七傷髓氣竭絕 果如常作髓餅入爐上下着火燒則須徹裏過熟氣 從答更入生薑鹽等各少許煮成美食之 右炒羊腎并髓等欲熟下米并豉汁中五大蓝次下 日空腹食之一所覺腰腎及膀胱煖則止 羊腎一對去內從答百利去敏皮生募前一羊髓 两雄白 題切 息白半两去 粳米一 日本の 京

一致定匹庫全書 羊野羹方 右搖為末每對猪肾用藥末二錢入鹽沒麵像肝角 右先炒腎及肉葱白生薑欲熟下水二大選半入枸 子樣修製灰內煨令熟薄茶空腹食之 懷香子而木香內巴戟而附子去皮腳 山茱萸 羊野脂膜切羊肉两機枸杞葉一升葱白豆蓝虫 两猪野膜細切 漢椒微炒出汗一猪野一對去脂漢似去目閉口 粳米雨生薑分三 治五勞七傷野氣不足 卷二百五十八 者

|慈致粥方思方治五勞七傷體熱喘急四肢煩疼 羊髓粥方忠方治五勞七傷補虚强志益氣 等煮作粥食之 右以炒腎及葱薑欲熟入水二大盞半次入米五味 把葉次下米五味等煎作奠食之 米合肉從容官利去做皮 香政会惹白却半羊髓一鹽花鐵薄荷三十 羊髓合羊野原細切 葱白 類切 生薑切 梗 告野方 オセ

|欽定四庫全書 猪野美方忠母治五勞七傷作寒下熱背膊煩疼蘇瘦 無力 右以水三盞先煎葱白四物十餘沸下毀汁更煎五 黄及米煎作羹食之 右猪腎煮及葱白欲熟者豉汁五大盞入生薑下地 七沸去豉入米二合煮為粥空腹温服之 粳米合 猪肾脂膜切生地黄切 葱白景切 生盖切的 卷二百五十八

內從答粥方出聖治五勞七傷久積虚冷陽事都絕 **主鷄方忠す治五勞七傷益下元壮氣每服經月餘肌** てこうこ 粥入五味 空心食之 右先将鷄煮爛擘去骨汁下米及鷄內旋蓉等都炭 內充盛老成少年宜服 內從蓉二两酒浸一宿戶膠令黃縣為末粳米 黄雌鶏川陽職 內從常刊去數皮切 生著預 禸 阿魏炒過粳米泊合

蘿摩菜粥方忠す治五勞七傷陰囊下濕癢 多块吃庫全書 羊腎粥方患方治五勞七傷羸瘦陽氣不足心神虚煩 右煮羊肉從容梗米作粥臨熟下鹿角膠末以鹽醋 右以細切煮粥調和如常法空腹食之 五味調和作两頓食之 合羊肉细切 難摩菜十半野一對去 白羊野品膜切羊髓四白粳米二 卷二百五十八 粳米

枸杞粥方出聖治五勞七傷庶事衰弱 CIO IN LILIA 鹿野粥方出聖治五勞七傷陽氣衰弱益氣力 椒食之 右以或汁相和演作粥以五味葱白等調和食之 右以水二盡煮米作粥熟下鹿角膠旋蓉及蔥白鹽 右相和煮作粥入鹽椒空腹食之 枸杞排 類米 鹿野川期去脂肉從蓉司去數皮切 粳米二 告所方 丁九

猪對羹方思方治五勞七傷陰麥贏瘦精髓並竭四肢 鷄肝粥す 金好四月全書 少カ 右以水二大蓋半入五味及葱煮作粥空心食之 右用政汁二大盡半相和煮作粥奏入鹽醋椒葱空 腹食之 **省野**馬膜 雄鶏肝一其死絲子本半栗米二 惠方治五勞七傷陰痿虚弱 切去 枸杞葉切斤 卷二百五十

煮羊頭蹄方此な補五勞七傷虚損 牛野粥方也聖治五勞七傷陰痿氣乏 בונו וייי בוויי 右以水先煮頭蹄半熟内藥更煮今爛去骨空腹適 右以水五大蓋煮陽起石取二盞去滓石下米及腎 五味葱白等煮作粥空腹食之 慈白小半 鼓斗 白羊頭蹄一具草火烧令胡椒五華美我乾薑 斗野一對去脂陽起石四兩類米二 古所方 투

|動定四库全書 治風胎瘦病五勞七傷虚點悸 宗婦人以血氣為本起於腎虚所至故云陰氣不足陽 夫骨蒸之病而多異名為療皆同一體丈夫以勞損為 性食之日食一具消七日且暫止禁冷生醋滑五辛 陳具猪鷄等七日 五味調和食之 用白羊頭一枚婦如食法煮令極熟切於豉汁中 食治骨蒸勞附論 冬二百五十八

杏仁粥方出聖治骨蒸煩熱效敢 多即少起夢與鬼交驚悸不安時時盗汗毒氣傳及五 乾或寒或熱四肢無力毛髮乾焦咳嗽頭疼精神昏問 必凑之血氣不禁骨髓枯竭腎主於骨以先從骨熱故 臟日漸羸瘦宜以食治之 病嬰孩之流傳注更甚其状心胸煩滿骨節疼痛顏口 くこうえ しょう 口骨蒸又大都此病起於無端不問老小男女皆染斯 方 告添か Ŧ

多好四库全書 牛膝葉羹方出聖治骨蒸勞背膊煩疼口乾状熟四肢 無力 Z 右先以水煮作粥次入杏仁等及煮冷熟不計時食 右先以水五大盛先煎薑豉取汁二大竈半去薑豉 杏仁雙仁水研取汁 生地黄取汁 生薑研取 牛膝葉丽龍葵菜丽地黄葉四生薑錢豉十合 **计塞半粳米台酥再**

枸把葉根方此聖治骨蒸勞肩背煩疼頭痛不能下食 こうこう こうこう 地武禁猪野羹方息方治骨蒸勞作寒作熱背膊煩疼 黄葉等於汁中煮更入鹽醋米同作羹食之 右先以水二大盞煎豉等取汁一大盞半去浑入地 及瘦弱無力 下牛膝葉等煮作羹入少鹽醋調和食之 生量切 生地黄葉切 猪腎脂膜切豆或合葱白烹遊去 分 普濟方 圭

多定四库全書 地黄粥方此聖治骨蒸勞瘦日晚寒熱效嗽哑血 意政粥方出聖治骨蒸勞煩熱致吸四肢疼痛時發寒 葉等養作奏調和食之 右先以水三太盡煎豉取汁一盛五分去豉下枸杞 右以水一大盏先煮米欲熟入地黄汁次下酥候下 熟温温食之 枸杞葉西青蒿葉而葱白景切 致合 生地黄汁合粳米合酥料 卷二百五十

欠巨马百台 酸素仁粥方忠弘治骨蒸心煩不得眠臥 酒煮鰻鱺魚方出聖治骨然勞瘦及腸風下蟲 右用鰻鱺魚二斤治之如法對作段子入鐺內以好 酒三大蓋熟養入鹽醋食之 右以水二大畫半煮蔥豉取汁一盡半紋去蔥豉入 執 米煮粥不計時候食之 致合意白景切 粳米二 香港方 圭

金岁口店 膳可安脏腑用補虚贏者兩 但服餌有法功効殊常今則煮鍊取其精華調品成其法 較時候食之 右用酸素仁二兩以水二大選半研濾取汁以米 石性甚剛猛利而能禁養陰陽逐氣祛風悅澤顏色 三合煮作粥候臨熟入地黄汁一合更微煮過不計 食治附論 食治補益虚損於諸內中蒸煮石英及取汁作 とうきと

猪 發動 肚煮石英法患方治虚損凡人年四十己下服二大 兩四十五十及至六十己上加二兩常用四月以後 服之候接秋氣石力下温其臟補益腰腎得力終無 酱切一 白石英袋盛都維合人参 方 椒四及十 兩惹白七 遊成半肉少 附九 ロ粒 蘆頭 生地黄切 生 ÍŢ 猪肚净找 F 粳米

| 欽定四庫全書 | 釀猪肚方患方治虚損不足令人肥白悅顏色 去石英袋記取肚及汁将作奏服之每年三五度服 右藥及石英袋並內猪肚中急繫口勿使洩氣以水 每服石英依舊餘藥換之分數一依初法 · 丰煮至二升即停出藥肚若盤內使冷然後破之 猪肚净洗白石英热碎生地黄切合饋飯料紫石 三姓去題少許 石英同線表 川椒者微炒去一兩槌碎與白川椒三十粒去 卷二百五十八 Đ 提 及 末川 u 葱白

ころうし 三石猪腎美方點力治腎氣不足陽道衰弱 右 右先将三石槌碎布褁以水五大蓋煮石取二盏半 去石著猪腎茯蓉枸杞鹽醋酱五味末等作美空腹 出石英細切任性食之 食之 拌和諸樂等內猪肚中以麻線縫定蒸令爛熟取 内旋落引去敏皮切 枸杞半 紫石英西白石英西磁石淘去赤汁猪肾脂膜 fr Ī 切去

|舒定匹庫全書 三石水煮粥方出聖治陰痿囊下濕或有瘡虚之無力 服牛乳方出聖補虚益氣 右槌碎布最以水五大蓋煮取二邁去石下米三合 作粥食之其石每日煎用之經三箇月即換之 右入銀器中以水三升和乳合煎取三升後収瓷盒 中每於食前煖一小蓋服之 紫石英四白石英四酸石八两槌碎 牛乳五華芝末西 卷二百五十八

TO THE LITTE 羊肉中蒸石英服餌法無か治虚損不足 石英水煮粥法 去石英後取肉細切和葱椒薑等作罨肉空心食之 後又将布裏於二斗米飯中蒸之候熟即出肉却檢 右用精羊肉一斤白石英三兩肉切作兩段對作 疼痛不可持物 孔內石英者內中還相合即用荷葉東又将蠟紙裏 白石英西 磁石并槌碎 治腎氣虚損陰痿周瘅風濕肢節中 普派方 卖

慈致湯無聲濟治服乳石因食倉米臭肉發動者 金女口四百書 劑差 升即添一升服經一年諸風並差氣力强盛顏如童 月氣每日取水作奏煮粥煎茶湯與皆用之用却 右以水二斗器中浸於露地安置夜即揭盖令得星 右以水二升煎至升半去滓作常服致汤服可五六 慈白切 姓致合 卷二百五十

白石英粥方總録浴石發 **クニフェーニー 煨羊野方忠方治虚損脚膝無力陽氣不盛補益** 時方養犢而羸瘦者每日秤一兩石英末拌豆與食 之經七日即可取乳每每朝空服熱飲一升餘者作 右用白石英五斤搗節細研三日一 **暑煨令熟空腹食之** 右取羊野切去脂膜分為四片掺令与却合用濕紙 羊野對鍾乳粉分 きかか 乳斗十歲以上 Ė

金兵四库全書 服乳石後将慎紫傳色方無聖濟 等類膽流食之或作冷淘食亦得和山芋作餺飥益 出則添豆汁勿無水熟即出之任意以猪羊肉菉豆 右 先研末和牛糞糞地種枸杞牛膝豆菜等食之益人 則亦不拘此斗糞糞地種菜供服乳人食甚住一方 仍依常法作餺飥還向此豆汁中熟煮可三七沸溢 糜粥任意食之百無所忌五月上旬起良如急要用 用好鳥豆任多少煮取濃汁以代水入少鹽和麵 尽二百五十八

油麵轉託方出聖補虚勞 こうこ 條為羹亦佳大麥和黑豆相拌熟蒸任意食春夏服 之良冒熱遠行将大麥作餅食之壓石堅飢 餅方與肆濟治乳石發動 為住 右用新大麥為麵和肉汁作餅食之大凉麵作柳葉 右以微火煎盡泔清乃止出貯之取冷鹽湯二合将 生胡麻油州折梗米泔清 普派万 斤 汽

多定四庫全書 益野氣强陽道出本草 令人長脂肉肥白出本草 夫心腹者由寒客於臟腑之間與氣血相轉随氣上下 右用白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜鲞食之三日 右用猯肉和五味煮食之 和麵作轉色煮令熟入五味食之 度甚妙 食治心腹痛附論

華炭粥方出聖治心中冷氣往往刺痛腹脹氣淌 攻繫心腹而痛臟氣虚邪氣勝停積成疾故令心腹痛 也宜食治之 C. 1312 1145 攬令与每日空腹食之 右搖羅為末以水二大選米煮粥候熟入藥末三錢 華安分胡椒分乾薑一分 檳榔分桂心分栗米 告所方 彭

金定四厚全書 桃仁粥方 高良薑粥方出聖治心腹冷氣往往結痛或遇風寒及 喫生冷即痛發動 末空腹食之 右先用水煮米作粥次下桃仁等汁更熟調入桂心 畫一分并地於桃仁以 桃 高良薑餓粳米合陳橘皮五錢湯 惠方治邪氣攻心腹痛出聖治邪氣攻心腹痛 去皮尖 生地黄而桂心五錢粳米三合生二十一枚生地黄而桂心五錢粳米三合生 卷二百五十

高良薑粥才總母治心腹積冷結痛 華发粥方也聖濟治心腹冷氣污痛妨脹不能食 こうこ 右搖羅為麵每服三錢鹽水一稅半入葱一握豉半 末同黄少頃空腹食之 投米煮粥空腹食之 右以水三大蓋煎高良薑陳橘皮取汁一盞半去滓 合先教慈致熟去滓次下米三合煮粥将熟入前藥 華芝而胡椒而桂三分 普亦方 毕

桃仁粥方 冥茱萸粥總母 治心腹冷氣衝脇肋痛 多定四库全書 熟入五味調和空腹食之 右先以水二大升煎高良薑取一升半去滓下米煮 分并照少許空腹食之 右先用水二升下米入葱豉同煮熟後下茱萸末 高良薑推為末白米云 具茱萸水浸去 涎焙乾 治冷氣心腹痛煩悶及治效嗽氣喘

椒麵粥方 紫蘇子粥方 UC. 3 ... 1.1. 粥候熟入桂末食之 右搖碎紫蘇子以水二大盜紋憑取汁入米二合養 右以桃仁汁煮粥空腹食之 到秋去日及閉口者一分妙出 紫蘇子做炒桂心末鈍 桃仁去皮尖雙仁雅 治久患冷氣心腹結痛嘔吐不能下食 治冷氣心腹痛煩脹不能下食 普不万 粳米三大 白麵三 华二

一金 近四库全書 夫 之也 食羊家方 虚虚則受於風冷與真氣交争於腰脚疼漏宜以食治 腰脚痛者由腎氣不足受風邪之所為也勞傷則腎 右将椒末於麵內拌勻於豉汁中煮今熟空腹食之 熟羊脂西熟斗髓兩白蜜西熟猪脂两生薑汁 食治腰脚疼痛附論 方 治虚勞腰痛咳嗽肺姜骨蒸 卷二百五十

羊臌羊方 以酥代胎髓加麥門冬汁若不能食或多風者加白 右将猪羊脂煎一沸次下牛髓又煎一沸次下白蜜 生薑地黃汁微火煎不住手攪膏成貯蜜氣中每服) 赴許空腹温酒調下美粥中服之亦得若食素者 羊肝肚野心肺各一具湯胡椒一草茭一豉一牛 生地黄汁西 治虚勞腰脚痛 ち不ち 9+1

|氫定匹庫全書 羊腎飢鈍方 羊肝等并汁皆內羊肚中緊肚口别用絹袋盛之煮 右先以五味相和以水七升慢火煎取五升去滓和 熟来熟出切肚食之旋旋服盡藥汁 右抵 桂心酐 酥一怒白細 五味子而山茱萸一乾薑炮裂川椒去 細羅為麵每日取羊骨一對去脂膜細切入 治野氣虚損腰脚疼痛 切控 卷二万五十八 徴目 炒及 M 去

豉酒方 羊脊骨羹す **教和汁食之 凌成羹空腹食之** 右炒腎肉斷血即入薑蔥五味然後添骨汁入米重 兩錢木臼內杵如泥作飾用和類稔作飢鈍以水熟 白五藍栗米二 羊脊骨 治下瞧風濕腰脚疼痛行復無力 **丰煎取五升羊野脂膜切羊肉細切葱** 治腎氣虚冷腰脚疼痛轉動不得 苦がち 111

銀定四庫全書 猪肾粥方 腹食之 右相和炒至雄熟投於三升酒中更煎四五沸每取 右以豉汁一升半煮粥入五味并酒調和如常法空 政合雖白先去滑門子皮臍科末 川椒 小盡攪粥食之 14] 猪野脂膜切米合慈許盛計 U 治腎虚氣勞損腰膝疼行動無力 去五 月十 及挝

又枸杞羊野粥方 羊脊骨羹方 2017 111 猪肚炙方 大盡入米二合及葱椒鹽醬作羹空腹食之 右以水七大蓋煎骨取汁四大蓋漉去骨每取汁 右細切加五味煮粥如常法空腹食 羊肴骨槌碎葱白鬚切 梗米四 枸杞葉斤羊腎一對米合蔥白女 治下胨風冷腰脚疼痛轉動不得 治肾臟風冷腰脚疼痛轉動不得 治陽氣衰腰脚疼痛五勞七傷 哲介が 610

|| 動定四庫全書 生地黄鷄方 腹食之無飲酒一兩盡勿今過度 盗汗少食時復吐利 右以椒葱鹽酱并酒附子末拌和煮亦作肉炙熟空 右先将鷄去毛皮及腸臟細切地黄與糖相和內鷄 腹中銅器貯之復置甑中蒸飯熟樂成取食之勿用 指肚湯洗 酒升附子皮脈科末 生地黄內的糖西烏鷄人 治腰背痛骨髓虚不能久立身重氣乏 卷二百五十

梅實仁粥方 桂心酒粥方 火足四車全書 1 食之 右媛酒和桂心末空腹分為二度攬粥食之 右煮米令半熟即下梅實仁相和攪令与候熟空腹 題醋食肉畫即飲銅器中樂汁 梅實仁極細形米二 桂心半两好酒一 治腰脚疼痛不可轉側 治腎脏虚冷腰脚疼痛不可恐 普濟方 聖五

金ルナロ 白羊腎羹方 婆羅粥方 熟水润過空腹頓食之 右相和入葱白鹽醬椒煮作羹如常法空腹食 右 将牛膝於麵中拌作婆羅粥煮熟干沸漉出則以 牛膝一两去当到白麵四 白羊腎止對去肉從落是細切 ルノニー 食治脾胃氣弱不下食附論 治腎臟風冷腰脚疼痛 治久積虚損陽道虚弱腰脚無力

形潤神必歸於食莊子云納滋味百節肥馬脾養肌肉 則諸藏氣竭肌內消瘦百病輻凑宜以飲食和益胖胃 之氣滋潤臟腑養於經脈祛疾之甚可謂上醫故干金 氣故云人之虚者補之以味味以行氣氣以實志言滋 夫脾胃者位居中宫象夫土也土生萬物四藏令口其 云凡欲治病先以食療既食療不愈後乃用藥爾 脾胃氣弱即不能消化五穀氣虚弱則腸鳴泄痢既多 17.12.11 1.1. 古香石 P ..

多近四庫全書 醸羊肚方 羊 醋無坊 合勿令洩氣蒸令極熟分三四度空腹食之和少酱 右取諸樂末拌和內米蔥鹽等內羊肚中以稅線縣 肝健僻方 薑木 生薑切 彭白其切 羊肚如常法羊肉細切食茱萸半两人参去蘆頭 两陳橘皮一兩湯浸胡椒 治脾胃氣弱不能下食宜食 治 脾胃氣弱不能飲食四肢羸瘦 たこ 百五十八 大分 月豆笼 月秋去乾 粳米五合題末

事業方 右先炒肝雖欲熟入豆蔻等末鹽湯凍麵作饆饠爐 右先将五味就羊骨汁中作羹空腹食之 東傳熟每日空腹食一兩枚極效 尊菜四鄉魚紙果燒熟去陳橘皮湯及生薑一葱 茱萸十分無夷仁二分華撥一錢雄白一合 白生破羊骨汁去骨 白羊肝膜細切 內豆蔻殺末 乾薑裂木 治胃氣弱不下食四肢無力漸羸瘦 若丹万 四七

多定匹库全書 豆蔻發蒸方 鹿髓煎方出す 食之 右入麵沒乾即便入黃牛乳調看稀稠得所灌入藕 中逐竅令淌即於甑中蒸熟每飯後或臨卧時少少 麵两四 草豆蔻仁恨枝高良薑料两生薑汁仁羊肉炒 鹿龍錢家合酥合生地黄汁合杏仁两桃仁 治脾胃氣弱食即吐嘔逆 卷二百五十八 西腊

杏仁粥方忠女治肺氣療虚贏喘息促急效敢等 Carried Train 右以水三大盏先煎桑根白皮豪薑等取汁二盏将 米煮粥臨熟入杏仁汁更熟五七沸不計時候食之 盒中每取一匙攬粥半盏不計時候食之 右煎地黄杏仁桃仁等汁鹿髓酥蜜煎如稀傷収瓷 桑根白皮当两生薑切分 杏仁研碎以三合黄牛乳紋取汁東去核粳米合 以酒浸絞取汁一升各湯浸去皮尖雙仁研 普州方 哭

藥餅方坐雖濟治多年肺氣放收 藥墨方出聖治積年效哦不差 多安匹库全書 右 服 右鐺中炒令酥盡去莨菪取賽去皮食之民日三五 即住来日早晨轉下惡物有蟲如頭髮相似為驗 和颊裹燒熟空腹食之時以冷水更換浸兩手良 羊子肝為四片麝香錢二膩粉 秦年故季一致茂岩一錢水 一方無良岩 卷二百五十八 銭-

猪 猪 食猪野方出野麻 たこうい 肌 右 器盛每日與半盛許 右先以炒猪脏 肥方忠 方治上氣效嗽胸膈煩湍氣喘 酒方 以濕紙果煨令自熟去椒細嚼食之 猪野仁其每具上蜀椒去目 猪 服 こここ 惠方治肺氣效吸上氣父不差 一具生地黄老破細切生地黄狼破 治久效嗽不差 即下地黃薑蔥鹽或候熟下湯以瓷 普濟方 餳 两四 粒及 内閉 腎口 孔者 里九

ス 杏仁錫粥方出聖治上氣致較 一金英四库全書 滓隨意温服 右以無灰酒三升同浸秋冬七日春夏三日布憑去 右相和得所每取一 惠出 猪 稀錫三杏仁雙人髮研成膏 生薑汁石沙糖瓦 方聖 胍 二具大東、 是攪粥半盏不計時候食之 卷二百五十八

治 醍 治勞瘦温中補不足咳嗽其本 てこうこ 飯後喫之 **欬嗽父不差**總 右用真酥不拘多少煉三次取醍醐每服一合差中 醐方思な治一切肺病欽嗽極濃血不止 右用猪腿 邪風皮膚瘙痒温酒 右煎令相和每服一 具薄切入竹筒於糠火中炮令極熟食 维聖齊 調 是攪粥半盞不計時候食之 音用が 服 <u></u>

| 動定匹庫全書 實不調故上衝於目則令赤痛久不能差變生膚翳者 虚不能荣養於目故目暗也若風熱之氣在於脏腑虚 竹葉粥方出聖治膈上風熱頭目赤痛目視脆脆 眼睛上有物如蠅赳是也宜以食療之 右用蘿蔔和羊肉腳魚煮食之 目者肝之官肝藏於血禁養於目腑脏勞傷血氣俱 食治眼痛門論 卷二百五十八

裕 大小司三 八十 蔓菁子粥方忠な補中明目利小便 肝養方點方治肝臓虚弱遠視無力補肝 **教粥熟入沙糖食之** 右以致汁中作養臨熟打破鷄子投在內食之 右以水三大盛煎石膏等三味取二選去滓澄清用 蔓菁子合粳米合 者肝一具細切葱白一握去鶏子三 竹葉五十片石膏西沙糖西浙粳米四 五

金豆四厚全書 蒼茸子粥方忠な治目暗耳鳴 蓮實粥方恵す益耳目聰明補中强志 熟食之 右握碎入水二大盏紋憑取汁著米煮粥空心食之 右先養蓮實令熟次以粳米作粥候熟入蓮實攬与 右搖蒼茸子爛以水二升紋濾取汁和米煮粥食之 養茸子科粳米科 敢運實 五钱去 粳米 三 卷二百五十

馬齒實拌慈致粥方出聖治青育白野明目除邪氣利 又方出聖 青羊肝方出聖 右用葱子半升炒熟搖細羅為散每服用一匙以水 右用青羊肝一具細切水煮漉乾以鹽酱醋調和食 之立見效 或作散煎服亦住 · 藏煎取一盡去海下米煮粥食之 普濟方 . <u>5</u>

一多定匹庫全書 死肝粥方思な治目暗青育明目 鳥鷄肝粥方患す治肝臓風虚眼暗 与攬食之馬 盖菜作養粥與並明目極佳 右用熟馬等實一斤搖為末每服一匙煮蔥或粥和 大腸去寒 驗為度 右用鳥鷄肝一具細切以豉汁中和米作養粥食之 右用兔肝一具細切以豉汁中作粥空腹食之以效 卷二百五十八

栀子仁粥方出聖治熟發眼赤狸痛 C. 10 10 / 11/10 鶏頭實粥方出聖益精氣强志意聰明耳目 夫耳鳴耳聲者肾為足少陰之經而藏精其氣通於耳 右用鷄頭實三合黄令熟去殼研如膏入粳米一合 為粥臨熟時下栀子木一分攪匀食之 右用栀子仁一兩搖為末為四分每服用米三合煮 合煮粥空腹食义 食治耳鳴聲附論 告済方 えま

金分口屋 耳鳴也 氣不足宗脈則虚風邪乗虚隨入耳中與氣相擊則為 勞傷血氣無受風邪損於腎藏而精氣脫則耳聲也血 耳宗脈之所聚若精氣調和則腎氣强盛五音分時若 猪 野粥方出聖治野職氣億耳蘇 獖 頭去 · 養粳米合雅白七蓝去 猪野脂 ヵ 白情 膜對 切法葱白 鬚切 人参養頭未二姓去人参一分去 防 風

菖蒲羹方組雖濟治耳蘇耳鳴如風水聲 羊野羹方忠聖治耳聲耳鳴 311 右将樂末并米葱薤白著水下鍋中煮候粥臨熟 右作美如常法食之空腹飲 開中心下腎莫攪動慢火更煮久入五味空腹食之 昌浦 羊野原細切一生山芋去皮葱白擘破生薑一 合剤 三 一宿判焙 猪野及筋細二兩米泔浸猪野一對去 切胎 膜葱白骨破米 표

金定四年全書 人參粥方總解治耳蘇耳虚鳴 右以水三升半煮菖蒲取汁二升半去海入猪野葱 空腹服 白及五味作羹如常法空腹食 右先将磁石於銀器中以水一丰煮取三升入猪腎 及粳米五合如常法贫粥候熟入煎二味更贫数沸 切 人參下合防風去又為破石碎綿裹者皆品膜 巻二百五十八 細去

磁 猪野羹方此聖濟 27.17.2 除頻熱 **来煮粥臨熟入酒一合調和如常法空腹食** 右用水五升先煮磁石取汁二升去磁石下羊腎及 石羊野粥方無緊治耳蘇養野藏强骨氣益精髓 右用五味汁作奠空腹服 猪野去筋膜 磁 石稱綿裝置器中羊腎順研爛) . I. . . . 納 治耳蘇耳鳴如風水聲 蜀椒去日及 音平方 汗三 刚 7 拉陳橘皮洋 五玄 切分

多定四月全書 磁 鹿腎粥方忠聖治耳聲補腎氣 煎之 石腎羹方忠重治久患耳華養腎臟强骨氣 右於政汁中五味調和煮粥如常法空腹食 致薑椒作羹空腹服之作粥及入酒並得磁石常用 右以水五升黄磁石取二升去磁石投腎調和以葱 磁石 鹿野川野 去赤汁綿裹一斤狼碎水润 爛去 脂米 卷二百五十八 猪野原細 切去 Aà

鯉魚腦髓粥方出聖治耳醇不差 烏鷄脂粥方出聖治耳聲久不差 てこしこ シニ 白糖膏粥方患な治五臓氣壅耳難 亦住 右相和煮粥入五味調和空腹食之鳥鷄脂和酒飲 右和煮粥調以五味葱豉空腹食 烏鶏脂四梗米白 白鴉脂而梗米合 告亦万 平六

乾柿粥方忠 銀兵四月全書 夫稍渴者有三般一者稍渴二者稍中三者稍腎若飲 水多者小便又少名曰府渴若喫食多不甚渴小便數 右煮粥以五味調和空腹食之 右於豉汁中煮粥空腹食之 乾 鯉魚腦隨四粳米合 柿無故粳米三 食治三鸦 万治耳聲及鼻不聞香 門論 卷二百五十八

不 欠い口声には 能 者有脂液名曰鸦肾此盖由積久啥食鹹物灸肉飲 消瘦名曰稍中若渴飲水不絕甚者腿膝瘦弱小便 廖不自保惜死不旋踵方雖效驗其如不慎者何其 不休遂使三膲猛熱五臟乾燥木石猶且燋枯如何 物無以喻如此之味酒徒號嗜不離其口酣 過度皆成府渴然大寒凝海唯酒不永明其酒性酷熱 由已飲敢無度加以醋皆不擇酸鹹積年長夜酣 不渴治之愈不愈属在病者若能 告所方 如方節慎旬 醉 己後 Đ 所 制 酒 渴 而 飲

自可無他不知此者縱使金丹玉粒亦不可救矣良可 金岁正是台書 羊肺羹方 悲夫宜深思之今以飲食調治以助藥力也 慎者有三一酒二房三鹹食熟麵能慎此者雖不服藥 右相和依常法作養飽食之 鹽 羊肺如食 精羊肉切两粳米各葱白蓝生薑沙 回片 許各 治三病小便數 步

LANDING LILL 羊骨湯方 治甭渴飲水不止方 内傳託煮之令熟即并汁食之 右黄丹等末水和麵澳傳託先煮葱薤白今爛熟即 即温汁量意飲之以差為度 右各分作兩處煮每度用水六升煮至三升去滓渇 黄丹分孫蘇根一 感白一握白麵西雄白一 羊者骨作者連致一白栗米升發白一握 治病渴 告所方 握

杏酪粥方 金舜四月全書 藕實羹方 治瘠渴煩燥狂言目眩 教兔方 右依常法煮粥食之入锡沙糖和之更大美也 右於豉汁中作羹入五味食之 親實去皮薄荷打事來中 杏酪前極濃黄牛乳一大麥 二合折 免收新孫根白皮維斯 治病渴神效 治三府心熱氣逆不下食

麥豆方 鹅蜜浆方 ここり!! !!! 右净淘於星月下各貯一鐺中用水二升慢煮熟次 即飲後仍喫三兩匙麥仁緑豆尤妙 取菜豆遇麥仁鐺中同煮令爛并汁水在瓷瓶內渴 食肉并飲其汁即效 右剥死去皮及腸胃與桑白皮同煮爛熟為灰畫力 大麥仁年菜豆建去皮 治痟渇 治稍渴口乾心中順熱并散積血 吉所万 五九

金定四庫全書 抓戴根羹方 赫勒粉方 渴即量意食藕并飲汁 右新汲水一升半化蜜令散內藕於蜜中浸半日許 右以水六升入鹽豉半升煎至五升去豉下前二味 醋作羹分三度食之 旅蘇根 独细切冬瓜去縣細 生親去收鍊家各半 治所渴 治府渴口乾心神煩燥 卷二百五十八 to

鹽致飲患方治消湯 スかりい ノート 須 右用濃煎鹽豉汁停冷渴即飲之 要一升水一斗煮至二升不問食前後稍稍飲汁又 許服之大效二月三月八月九月造住用田螺活者 右用蘇蘇根多取削去皮於新瓦中磨記以水淘生 細絹袋擺如造米粉法曝乾熟渴時冷水調下一錢 方用田螺五升水一斗半浸經宿渴即飲汁每日 度易水弁螺一方用米一合教作粥食之 音派方 7

又方總録齊 又方總録濟 又方忠方 紀近四庫全書 又方出聖 之良 右用栗米炊飯頻食之佳 右用大麥仁炊飯或煮粥食之住小麥亦得水淘食 右用青小豆净淘煮粥食之和飲食亦得 卷二百五十八

黄雌鷄粥方 蒸鹿頭方 火モの事主告 生蘿蔔粥方 餘汁和豉作粥食之亦妙 右用黄雌鷄一隻治如食法爛煮取肉隨意食之其 右用鹿頭一具治如食法蒸熟以酱醋食之 右用牛乳飲 渴 治痛渴口乾 治府渴口乾小便數 治府渴發動無時飲水不足 小盛馬乳亦得生飲令人利熟飲令 告所方 至二

生なせたとう 茶豆汁方 野鷄肉汁方 有效 右用蘿蔔五枚轉換取汁一大選攪粥作飲 右用野鷄治如食法以水五大蔬煮取三大蒸渇即 右用亲豆二升净润用水一斗煮爛研細澄憑取 於早晚食前各服一小盛如覺小便濃即差 旋取汁飲之肉任性食 治消渴小便如常 治消渴舌性口乾小便數 卷二百五十八

葵虀汁方 梁米粥方 胡豆汁方 ていること しいう 法候熟渴即飲汁以差為度 右用奖一 時飲之以差為度爛研取洋飲之亦可 右用青梁米半升净润粳米亦得以水三升煮稀 右用胡豆二合黄取汁勿用鹽隨意食之 東洗湯內界黃過别煮栗米汁如常酸藍 治病渴及吐血心悶 治稍渴心悶 治痟渇 哲術方

一致定匹庫全書 地黄花粥方 右用地黄花陰乾擣羅為末每用栗米兩合净淘煮 為弼候熟入末三錢半攬勻更煮令沸任意食之 晋濟方卷二百五十 治鸦渇 卷二百五十八